

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 21-10-76313910

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

(AUDE - GARD - HERAULT - LOZERE - PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE - BAT. 5 - PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX - TEL. 92.28.72

ABONNEMENT ANNUEL 50 F.

Régisseur de recettes de la D.D.A.

C.C.P. Montpellier 5238-57

n° 34 - 1976

CERISIER

Chancre bactérien : Des infections sont possibles au moment de la chute des feuilles, sur variétés sensibles, dans les vergers atteints par cette maladie.

Une première application est préconisée à l'aide de produit cuprique, au moment de la chute des feuilles, à raison de 125 g. de cuivre métal à l'hectolitre (soit 250 g d'un produit à 50 % de cuivre métal, ou 500 g de bouillie bordelaise).

Une deuxième application est conseillée dans un délai de 15 à 20 jours : elle se situe pratiquement au moment de la chute des dernières feuilles.

PECHER

Dépérissement bactérien : Installée dans le département de l'Ardèche, cette maladie menace la zone de culture du pêcher dans la région Sud-Est, notamment où la bactérie s'est déjà manifestée en Costières.

Rappelons que les traitements effectués à l'automne constituent la lutte fondamentale pour empêcher l'extension de la maladie. Les arbres atteints doivent être arrachés et détruits.

Plusieurs applications à l'aide de produits cupriques, à 10 - 15 jours d'intervalle, sont nécessaires, en fonction de la défeuillaison et des périodes pluvieuses. Il convient d'effectuer les traitements sur des arbres bien ressuyés en traitant l'ensemble de la frondaison.

La dose préconisée est de 125 g de cuivre métal à l'hectolitre (soit 250 g de produit cuprique à 50 % ou 500 g de bouillie bordelaise).

La taille ne sera pratiquée que fin février dans ces vergers ayant reçu le traitement préconisé ci-dessus.

Fusicoccum : Dans les vergers, irrigués par aspersion sur frondaison et où la maladie s'est manifestée, il convient d'effectuer un traitement fongicide au moment de la chute des feuilles.

Les fongicides organiques à base de thirame, zinèbe ou folpel sont reconnus comme efficaces pour lutter contre le fusicoccum.

POMMIER et POIRIER

Tavelures : Le champignon se conserve pendant l'hiver, sous forme de périthèces, dans les feuilles.

Des mesures préventives sont préconisées pour limiter les risques de contamination au printemps, en diminuant la formation des organes de conservation grâce à un traitement.

Deux modalités sont conseillées selon la date de l'application retenue, et l'appareillage utilisé :

soit : après récolte, avant la chute des feuilles

Une pulvérisation abondante de la végétation est recommandée à l'aide de :

bénomyl	50 g. m.a./hl	(Benlate)
ou carbendazim	50 g. m.a./hl	(Bavistine)
ou méthylthiophanate	50 g. m.a./hl	(Pelt 44)

P. 199

soit : après la chute des feuilles en arrosage du sol, à raison de 1000 l. d'eau à l'hectare au minimum, à l'aide d'une solution de 5 kg d'urée par hectolitre.

POMMIER

Chancre bactérien : (voir cerisier)

La dose de produit cuprique utilisé contre le chancre bactérien peut être augmentée à 250 g de cuivre métal à l'hectolitre d'eau.

Sésie : Le traitement après récolte, vers mi-octobre, est le plus efficace contre ce ravageur ; l'intervention effectuée au printemps n'est que complémentaire.

Les produits préconisés sont : le dichlorvos (200 g m.a./hl) ou l'oléoparathion (60 g. m.a./hl). Effectuer une pulvérisation copieuse, si possible à l'aide d'une lance permettant d'atteindre les bifurcations des branches et les bourrelets de greffe.

OLIVIER

Dacus : L'activité de ce ravageur nécessite à nouveau un traitement pour assurer en particulier la protection des olives noires de table. L'adjonction de bouillie bordelaise à faible dose permettra de combattre le cycloconium et la fumagine.

Respecter les délais d'application (tout traitement insecticide est interdit 21 jours au moins avant la récolte des olives).

Le Chef de Circonscription,

L'Ingénieur,

V. LAGAÚDE

M. TISSOT

Tirage du 14 octobre 1976 - 1500 exemplaires
Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles - Place Chaptal - Montpellier
Le Directeur : P. JOURNET - n° d'inscription PP 531AD